

à donner au front et au sommet de la tête une forme aplatie. Queue arrondie; plumage vermiculé de petits traits noirs sur le roux vif des côtés du cou, varié de brun, de jaune de buffle et de blanchâtre, par croissans ou par taches arrondies; queue étagée, offrant quatre petites raies noires en dessous. Habite l'Égypte. (Mus. de Paris, M. Bert.)

34. HIBOU D'AMÉRIQUE; *Otus Wilsonianus*:

*Strix otus*, Wils., t. VI, pl. 51, fig. 3.

Les deux aigrettes des côtés de la tête très-allongées; le plumage très-tacheté; les rémiges rayées de ferrugineux; les ailes presque aussi longues que la queue. Habite les États-Unis et principalement dans l'automne la Pensylvanie. M. Lesueur l'a envoyé de New-York.

35. HIBOU COMMUN; *Otus communis*:

*Strix otus*, L., Gm.; Moyen-Duc d'Europe.

Plumage fauve, de longues flammes brunes dans le sens de chaque plume; les ailes et le dos vermiculés de brun. Queue ayant neuf ou huit barres brunes.

*Jeune âge*: Brun-rouge, strié de brun; tête cendrée.

Le hibou est commun en France et dans toute l'Europe.

*Variété du Brésil*: Face noire, tachée de blanc; corps brun en dessus, jaune buffle fortement taché de noir en dessous. Tarses velus jusqu'aux doigts; bec corné; huppées déjetées en arrière. Grand comme l'effraye. (Mus. de Paris; Brésil, M. Auguste de Saint-Hilaire.)

36. HIBOU MEXICAIN; *Otus mexicanus*:

*Strix mexicana*, Gm.; *Strix clamator*, Vieill., Am., pl. 20; *Strix longirostris*, Spix, pl. 9.

Regardé par la plupart des auteurs comme une variété de l'*otus communis*. Il a la face blanche, tachée de noir ou de roux; une collerette noire autour de la face. Plumage fauve clair, avec de longues flammèches d'un noir vif, très-nettes et très-distinctes sur leurs bords. Habite les États-Unis.